The Mixing Matrix

Atmospheric Cross-Mixing Solar

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} c_{13} & 0 & s_{13}e^{-i\delta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13}e^{i\delta} & 0 & c_{13} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\times \begin{bmatrix} e^{i\alpha_1/2} & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\alpha_2/2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$c_{ij} \equiv \cos\theta_{ij}$
$s_{ij} \equiv \sin\theta_{ij}$

Majorana ~~CP~~ phases

$\theta_{12} \approx \theta_{sol} \approx 34°$, $\theta_{23} \approx \theta_{atm} \approx 37\text{-}53°$, $\theta_{13} \lesssim 10°$

δ would lead to $P(\overline{\nu}_\alpha \to \overline{\nu}_\beta) \neq P(\nu_\alpha \to \nu_\beta)$. ~~CP~~